



## ČESKÁ VAKCINOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

V Hradci Králové dne 7.1. 2010

### *Výbor společnosti:*

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD. (předseda)  
MUDr. Hana Cabrnachová (místopředsedkyně)  
Doc. MUDr. Roman Chlábek, PhD. (vědecký sekretář)  
Prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.  
MUDr. Pavla Křížová, CSc.  
MUDr. Jan Kynčl, PhD.  
Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.  
MUDr. Jitka Škovránková  
Prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc.

### **DOPORUČENÍ K APLIKACI OČKOVACÍ LÁTKY PROTI ROTAVIROVÝM INFEKČÍM**

Na základě doporučení vydaného Českou vakcinologickou společností ze dne 25.1. 2008, o vhodnosti zahajovat aplikaci očkovací látky proti rotavirovým infekcím v podmínkách ČR v 9. týdnu života, vydává výbor společnosti následující upřesnění:

- 1/ nebylo-li dítě kalmetizováno, je možné zahájit aplikaci od 6. týdne věku,
- 2/ interval mezi jednotlivými aplikacemi by měl být minimálně 4 týdny, je tedy vhodné využít alespoň v případě jedné dávky simultánní aplikace s podáním hexa-vakcíny, respektive vakcíny proti pneumokokovým nákazám. Maximální intervaly mezi dávkami nejsou omezeny, ale schéma by mělo být aplikováno celé, vakcíny od jednotlivých výrobců by se neměly zaměňovat,
- 3/ dojde-li k aplikaci mimo současné simultánní podání s uvedenými vakcínami, je vhodné do další aplikace jakékoliv očkovací látky dodržet interval 14-ti dnů,
- 4/ přetrvává-li v době aplikace nezhojená kalmetizační jizva, tedy indikuje-li očkující lékař oddálení aplikace hexa-vakcíny, ale současně nejsou přítomné závažné komplikace po BCG vakcinaci podléhající hlášení nežádoucích účinků po vakcinaci, je možné aplikaci rotavirové vakcíny zahájit. Důvodem je odlišný princip navození imunitní odpovědi,
- 5/ v případě očkování nedonošených dětí, je vhodné očkování zahájit bez ohledu na gestační stáří, tedy podle chronologického věku, platí tedy i omezení uvedená v SPC u jednotlivých očkovacích látek do jaké nejpozdější doby chronologického stáří je nutné provést aplikaci v plném schématu. Toto doporučení se týká dětí v klinicky stabilizovaném stavu, jsou-li propuštěni z nemocniční péče. Otázka bezpečné dolní hranice zůstává stále otevřená vzhledem k velmi omezenému počtu hodnocených pacientů pod 32. gestační týden. Vakcínu nelze použít u dětí s vrozenou vývojovou vadou trávicího traktu, případně u dětí po prodělaných operacích trávicího traktu v novorozeneckém věku, resp. u dětí s chronickým onemocněním GIT.

Za výbor společnosti:

.....  
Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD.  
předseda ČVS

.....  
Doc. MUDr. Roman Chlábek, PhD.  
vědecký sekretář ČVS